



فونریزی های مامایی



درمان

در هر زن دچار خونریزی واژینال در سه ماهه سوم بارداری، لزوم وضع حمل باید طبق صلاحدید پزشک باشد. در این شرایط مادر سرم تراپی و اکسیژن تراپی شده و سریعاً تیم احیای نوزاد و احیای اتاق عمل و اتاق زایمان جهت سزارین مادر آماده می شود. در مورد دکولمان جفت اقدامات سریعاً و اورژانسی باید انجام شود زیرا هر لحظه امکان مرگ جنین وجود دارد.



آدرس: شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه

◆ تهیه و تنظیم مطالب: اتاق زایمان

◆ طراحی و چاپ: روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه

www.atiehhospital.ir

فونریزی های مامایی

درمان

در مسئله درمان موضوع مهم که نباید فراموش شود ممنوعیت معاینه‌ی مهبل‌ی در موارد جفت سر راهی می باشد. چرا که حتی با یک بار معاینه‌ی مهبل‌ی می تواند منجر به بروز خونریزی قابل توجه شده و حیات مادر و جنین را به مخاطره اندازد در صورتی که معاینه واژینال در سه ماهه سوم زایمان انجام شود تیم احیای نوزاد و اتاق عمل به طور همزمان آماده باشد. طبق بررسی های پزشک اگر جفت سر راهی باشد مددجو بایستی استراحت مطلق داشته و توصیه های بهداشتی و درمانی طبق صلاحدید پزشک داشته باشد.

تعریف دکولمان جفت

منظور از دکولمان جفت کنده نشدن جفت از محل خود را گویند که منجر به خونریزی شدید واژینال می شود.

علائم

شدت دکولمان اغلب بسته به این دارد که شخص در پی بروز علائم تا چه زمانی خود را به بیمارستان برساند متفاوت است.

۱) خونریزی روشن واژینال

۲) حساسیت رحم در دیسترس جنین

۳) انقباضات پشت سر هم و مکرر و یا انقباضات هیپرتونیک و جنین مرده در حدود کمتر از یک پنجم موارد می باشد.

از دیگر نشانه ها شوک و افت فشار خون مادر است.

جفت سر راهی، پارگی سینوس مارژینال یا عروق سر راهی یا دکولمان جفت از اورژانس های مامایی محسوب می شوند که می توانند منجر به بروز خونریزی شوند.

علل خونریزی ها

۱- جفت سر راهی

۲- دکولمان جفت که از اورژانس های مامایی محسوب می شود.

جفت سر راهی

به قرارگیری جفت در محلی غیر از محل طبیعی خود در حفره رحم گفته می شود. به طور مثال بر روی دهانه رحم یا در مجاورت آن، جفت سر راهی گفته می شود.

علائم

۱- معمولاً در سه ماه اول حاملگی رخ می دهد.

۲- خونریزی بدون درد است.