




فشارفون بارداری

آموزش:

استراحت در بستر(خوابیدن به پهلو چپ)، اندازه گیری مرتب فشارخون در وضعیت نشسته، توزین روزانه، رژیم غذایی کم نمک، اندازه گیری پروتئین دفعی از ادرار، بررسی آزمایشات خونی، بررسی جنین از طریق سونوگرافی و کنترل صدای قلب جنین، استفاده مرتب از داروهای تجویز شده توسط پزشک.



♦ تهیه و تنظیم مطالب: بخش میلاد

♦ طراحی و چاپ: روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه

www.atiehhospital.ir

فشارفون بارداری

علت:

علت ناشناخته است و فرضیه های مختلفی برای توجیه آن ارائه شده است:

- عدم تحمل بین بافتهای مادر، جفت و جنین
- تطابق نادرست مادر با تغییرات قلبی، عروقی
- کمبودهای تغذیه ای
- مسائل ژنتیکی و بیماریهای زمینه ای

عوارض جنینی شامل:

- زایمان زودرس
- جدا شدن زودرس جفت
- زجر جنین
- مرگ داخل رحمی
- کاهش رشد



فشارخون بارداری:

تشخیص فشارخون بارداری زمانی است که فشار خون 140 میلی لیتر جیوه یا بیشتر برسد در صورتی که در آزمایش ادرار دفع پروتئین وجود داشته باشد تحت عنوان مسمومیت بارداری شناخته می شود. در صورتی که افزایش فشارخون با تورم یا ادم دست و پا یا صورت و وجود پروتئین در ادرار همراه باشد به آن پره اکلامپسی یا مسمومیت حاملگی گفته می شود که در سه ماه آخر بارداری بیشتر شایع می شود چنانچه این وضعیت درمان نشود پیشرفت علائم به پره اکلامپسی منجر می شود که با تشنج، همراه بوده و عوارض بسیار شدیدی روی جنین و مادر دارد و گاهاً منجر به مرگ می شود.

