

نحوه مصرف داروها در بیماران تحت دیالیز



تهیه کننده: بخش دیالیز و واحد آموزش

تأیید کننده: رئیس گروه بخش دیالیز

تاریخ تدوین: 1393/4/1

تاریخ آخرین بازنگری: 1401/6/1

تاریخ بازنگری بعدی: 1405/6/1

ویرایش: 03

کد: ATH-ED/ED - 27

منبع: درمان بیماری مزمن کلیه - پرستار و دیالیز

در صورت وجود یکی از موارد زیر دارو را استفاده نکنید:

- کدورت یا رنگی شدن دارو، دارو شفاف و بدون رنگ باشد.
- مشاهده ذرات معلق و یا کف
- خاموش شدن یخچال در اثر قطع برق یا خرابی
- یخ زدن دارو بر اثر سرمای زیر صفر و یا گرم شدن در حرارت بیش از 25 درجه و گذشتن تاریخ انقضاء

ونوفر (آهن)

از ترکیبات آهن، ونوفر است که به صورت ساکروز می باشد، که کمک به درمان کم خونی می نماید.

شکل دارو: به صورت آمپول های 100 میلی گرمی باشد.

روش استعمال: به صورت وریدی می باشد، که توسط پرستار بخش دیالیز به همراه سرم تزریقی می شود.

عوارض: افت فشار خون، سردی، تهوع، استفراغ، درد مفاصل، درد عضلانی، سرگیجه، درد قفسه سینه، احساس طعم فلزی در دهان

مراقبت و توجهات: در صورت بروز عوارض حتما اطلاع دهید/ نیاز به نگهداری در یخچال ندارد/ در زمان تجویز قرص آهن قطع می شود.

کربنات کلسیم

قرص کربنات کلسیم به عنوان پایین آورنده فسفر و یا کمک به افزایش کلسیم مصرف می شود.

شکل دارو: به شکل قرص 500 میلی گرم است.

عوارض: یبوست، تهوع، استفراغ، خشکی دهان، دل درد، تشنگی و تکرر ادرار

مراقبت و توجهات: این دارو اگر برای اصلاح کلسیم مصرف شود، یک ساعت بعد از غذا میل می شود اگر با هدف اصلاح فسفر باشد، در وسط غذا میل می شود.

• در صورت بروز عوارض به پزشک خود اطلاع دهید

• شناسایی غذاهای پر فسفر و محدودیت مصرف

• در دمای 15 تا 30 درجه در بسته بندی نگهداری شود.

• به تاریخ مصرف آن دقت شود.

روکاترول یا کلسیتریبول

در درمان کاهش سطح کلسیم خون استفاده می شود این دارو جذب کلسیم روده را افزایش می دهد و ترشح هورمون پاراتیروئید شما را کم می کند.

شکل دارو: به صورت کپسولهای 25 صدم میکروگرمی است

عوارض: سردرد، یخوابی، ضعف، تهوع، یبوست، طعم فلز در دهان، خشکی دهان، بی اشتها

مراقبت و توجهات:

• دارو را می توان همراه با غذا یا معده خالی مصرف نمود.

• بهتر است که دارو را بعد از دیالیز مصرف نمایید.

• دارو را با ظرف مقاوم به نور و در محل خشک و درجه حرارت 15 تا 30 درجه نگهداری نمایید.

• در صورت بروز علائم ذکر شده به پزشک خود اطلاع دهید.

• از شکستن، خرد کردن یا جویدن کپسول خودداری کنید.

• در مصرف غذاهای غنی از کلسیم، فسفات و ویتامین D مثل لبنیات احتیاط کنید.

• در مصرف فرآورده های حاوی پتاسیم احتیاط کنید.

• دارو را همزمان با داروهای مثل سایتمدین،

رانی تیدین و کلسترآمین و داروهای ضد تشنج (مثل فنی تونین) مصرف نکنید این داروها اثرات روکاترول را کاهش می دهد.

• افرادی که دچار افزایش سطح کلسیم خون هستند نباید از این دارو استفاده کنند.

• به تاریخ مصرف آن دقت شود.

رناژل

کمک به پایین آوردن فسفر می کند. همچنین با اسیدهای صفراوی باند می شود و و بدین ترتیب سطح کلسترول خون پایین می آید.

شکل دارو: به شکل قرص های سفید رنگ بیضوی و روکش دار 400 و 800 میلی گرمی می باشد

عوارض: سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال و کاهش فشار خون

مراقبت و توجهات:

• رعایت رژیم غذایی کم فسفر

• این دارو با داروهای ضد تشنج، آنتی آریتمی، وارفارین و سیپروفلوکساسین تداخل دارد. فاصله مصرف رناژل با این داروها حداقل باید 1 تا 3 ساعت باشد.

• رناژل باید همراه غذا مصرف شود و قرص ها به طور کامل بلعیده شود.

• دارو در دمای 25 C باشد.

• اگر فراموش کردید رناژل را مصرف کنید، رناژل فراموش شده حذف شود و در زمان بعدی خود همراه غذا مصرف شود و از 2 برابر کردن دارو خودداری نمایید.

• به تاریخ مصرف آن دقت شود.

طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه
آدرس بیمارستان:

شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دامن

تلفن بیمارستان: 82721

فاکس بیمارستان: 88086095

www.atiehospital.ir

