



# الیگوهیدر آمینوس (کاهش مایع آمینوتیک)



تهیه کننده: اتاق زایمان و واحد آموزش

تأیید کننده: رئیس اتاق زایمان

تاریخ تدوین: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۸/۱۰/۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۹/۱۰/۱

ویرایش: ۰۱

کد: ATH-ED/ED- 49

منبع: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری سوم)



طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه

آدرس بیمارستان: تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دامن

تلفن بیمارستان: ۸۲۷۲۱

فاکس بیمارستان: ۸۸۰۸۶۰۹۵

شماره های تماس اتاق زایمان: ۸۲۷۲۳۴۹۱ - ۸۲۷۲۳۴۹۳

سایت بیمارستان: [www.atiehhospital.ir](http://www.atiehhospital.ir)

## علت مادری:


- ◆ دیابت
- ◆ پره اکلامپسی (مسمومیت بارداری)
- ◆ فشارخون بالا
- ◆ داروها
- ◆ علل ناشناخته دیگر

## تشخیص

با سونو گرافی است که نشان دهنده کاهش حجم مایع آمنیوتیک میباشد

## درمان

وابسته به سن حاملگی و علت ایجاد کاهش حجم مایع است. ارزیابی سلامت جنین به صورت دقیق باید انجام شود و مادر باید کاهش حرکات جنین را اطلاع دهد ممکن است مادر نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشد و با توجه به علت و سن حاملگی ختم بارداری اعلام گردد. استراحت نسبی یا مطلق باید بر اساس دستور پزشک باشد.



## الکوهیدرآمینوس چیست؟

کاهش حجم مایع آمنیوتیک بطور کاملاً ناشناخته که توسط سونو تشخیص داده می شود تعریف می شود که در ۱۲٪ حاملگی های ۴۱ هفته یا بیشتر دیده می شود.



## علت بروز چیست؟

### علت جنینی:

- ◆ محدودیت رشد جنین
- ◆ آنومالیهای مادرزادی
- ◆ پارگی کیسه آب

### علت جفتی:

- ◆ کنده شدن زودرس جفت