

پاپ اسمیر چیست؟

تهیه کننده: واحد آموزش و بخش زنان

تأیید کننده: مدیر گروه زنان

تاریخ تدوین: 93/5/15

تاریخ آخرین بازنگری: 98/7/1

تاریخ بازنگری بعدی: 99/7/1

ویرایش: 01

کد: ATH-PSY/ED-104

منبع: کتاب داخلی جراحی پرستاری (برونر و سودارث) و سایت اطلاعات پزشکی



اهمیت انجام پاپ اسمیر چیست؟

انجام این آزمایش بهترین راه برای کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان گردن رحم است و بطور کلی روش مؤثری برای پیشگیری از سرطان گردن رحم می باشد. در این آزمایش تغییرات پیش سرطانی احتمالی در سلولهای گردن رحم کشف می شود. درمان به موقع و مناسب این تغییرات پیش سرطانی از بروز سرطان در سلولهای گردن رحم در آینده جلوگیری خواهد کرد.

چه کسانی باید این آزمایش را انجام دهند؟


برای تمام زنانی که از لحاظ جنسی فعال هستند و بیش از 18 سال سن دارند. فواصل توصیه شده بین آزمایشها 3 تا 5 سال می باشد و بسته به نظر پزشک این فاصله کم یا زیاد می شود. در افرادی که رحم با جراحی از بدن خارج شده است (عمل هیستکتومی) بسته به نوع عمل جراحی و علت آن، پزشک درباره لزوم انجام پاپ اسمیر تصمیم می گیرد.

این آزمایش، تغییرات پیش سرطانی احتمالی و سرطان را در سلولهای گردن رحم نشان می دهد.

اگر تغییرات پیش سرطانی در مراحل ابتدائی، کشف و درمان نشود ممکن است به تغییرات سرطانی تبدیل شود. اگر تا کنون معاینه زنان توسط پزشک یا ماما برایتان صورت گرفته باشد روش انجام این آزمایش را راحت تر درک خواهید کرد.

پزشک هنگام معاینه، با استفاده از وسیله مخصوصی مقداری از مخاط و ترشحات گردن رحم را جمع آوری کرده، آن را روی لام شیشه‌ای پخش می کند و به آزمایشگاه می فرستد. انجام این کار درد یا ناراحتی زیادی ایجاد نمی کند.

در آزمایشگاه سلول های گردن رحم زیر میکروسکوپ بررسی می شوند، اگر هنگام بررسی لام زیر میکروسکوپ ضایعات سرطانی دیده شوند نمونه برداری از بافت گردن رحم لازم است. همچنین ممکن است بسته به نظر پزشک نیاز به تکرار آزمایش پاپ اسمیر باشد.



طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه

آدرس: تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار

فرحزادی و شهید دادمان

تلفن بیمارستان: 82721

فاکس بیمارستان: 88086095

سایت بیمارستان:

www.atiehhospital.ir

