


پورت کاشتنی (پورت پیوندی)



تهیه کننده: واحد آموزش

تأیید کننده: مدیر گروه جراحی

تاریخ تدوین: 98/7/8

تاریخ بازنگری بعدی: 99/7/8

ویرایش: 00

کد: ATH-PSY/ED-108

منبع: کتاب کارنت جراحی

- در مورد مدت زمانی که پورت باید در محل باقی بماند و این که چه زمانی باید تعویض شود با توجه به دستور پزشک به بیمار آموزش داده شود.
- از پوست روی پورت محافظت کند.
- لباس های زیر مثل سوتین و کمربند ماشین، روی محل پورت قرار نگیرد تا پوست آسیب نبیند.
- به جز در مواقعی که بیمار در حال تجویز مایعات می باشد می تواند بدون نگرانی دوش بگیرد، حمام کند و یا شنا کند.
- در مواقعی که بیمار در حال تجویز می باشد باید پورت را خشک نگه داشت و از آن محافظت کرد.
- در صورت نیاز به درمان طولانی مدت یک نیدل خمیده (نیدل هایپر) در داخل پورت قرار داده می شود و به یک پمپ انفوزیون سرپایی متصل می شود و هر 7 روز یک بار تا پایان دوره درمان، سر سوزن باید تعویض شود.
- پانسمان روی سر سوزن گذاشته برای این که اطمینان حاصل شود که سر سوزن پورت جابجا نمی شود و به صورت مرتب محل را چک می کنیم.
- بعد از اتمام دوره ی داروها پورت را با هیپارین و سرم 500 سی سی هیپارینه می کنیم تا خون موجود در محوطه داخلی پورت لخته نشود و برای مراجعه بعدی راحت استفاده شود.
- در صورت نیاز به نگهداری پورت، باید ماهیانه توسط سوزن مخصوص، محل پورت هیپارینه شود.

- پورت کاشتنی به منظور فراهم کردن یک راه دسترسی به ورید در بیماران نیازمند به تجویز مکرر داروها، محلول ها و فرآورده های خونی و برای گرفتن نمونه های خون استفاده می شود.
- پورت در زیر پوست کار گذاشته می شود به طوری که در معرض دید و دسترس کاری باشد.
- پورت از یک کاتتر پلاستیکی نرم با یک پایه فلزی و نوک لاستیکی تشکیل شده است که می توان از طریق آن داروها را تجویز کرد و نمونه های خونی تهیه کرد.
- پورت را با عمل جراحی در جدار سینه و یا شکم قرار می دهند، کاتتر از طریق ورید ساب کلاوین یا ورید ژگولار داخلی به داخل ورید اجوف فوقانی یا دهلیز راست هدایت می شود.

موارد استفاده:

- برای تجویز داروهای ضد سرطان، تغذیه کامل وریدی (TPN)، خون و فرآورده های خونی و مسکن ها
- گرفتن نمونه خون به صورت مکرر

آموزش های لازم بعد از جراحی:

- در مورد چگونگی نگهداری از پورت، آموزش های زیر به بیمار توسط پزشک و پرستار داده می شود:
- در صورت بروز علائم زیر به پزشک اطلاع داده شود:

- قرمزی
- درد
- برآمدگی اطراف پوست
- ترشح از محل برش جراحی و یا محل ورود سر سوزن
- درجه حرارت بیش از 37/5
- تنگی نفس
- دردسینه
- تپش قلب

طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه

آدرس: تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار

فرخزادی و شهید دادمان

تلفن بیمارستان: 82721

فاکس بیمارستان: 88086095

سایت بیمارستان:

www.atiehhospital.ir

